






RELEMBRANDO....




VACINA	DOENÇAS QUE IMUNIZAM	ESQUEMA	DOSAGEM	VIA/ LOCAL	OBSERVAÇÃO	LABORATÓRIO OU VALIDADE
BCG	Tuberculose	Ao nascer	0,1 ml	ID deltóide D	Observar processo de cicatrização por 6 meses.	FAR - 6h
Hepatite B	Hepatite B	RN = Ao nascer e após continua com Penta; Demais = 0,1,6 ou Especiais = 0,1,2,6.	0 à 19anos 0,5 ml	IM VLD ou deltóide D	RN = 1ª dose preferencialmente nas primeiras 12h até 30 dias, após faz Penta. Imunodeprimidos recebem doses dobradas. <u>Foi ampliada para todas faixas etárias.</u>	Butantan - 15 dias.
			0 à 15 0,5ml > 16 1 ml			Sanofi- 10 dias
Penta	Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus Influenza tipo B e Hepatite B	2,4,6 meses. Maiores de 1 ano com esquema incompleto receberam uma dose de Penta e continuam o mesmo com DTP.	0,5 ml	IM VLE	Imunodeprimidos fazem o 1º reforço com Penta e não DTP como as demais crianças. Idade máxima para receber Penta é 6anos 11meses e 29dias.	Índia ou Novartis unidoses.
VIP	Poliomielite	2,4 e <u>6 meses</u>	0,5 ml	IM VLD	Imunodeprimidos recebem somente VIP.	Sanofi - 7 dias
Pneumo 10V	Tipos de pneumonias e otite média aguda.	2, 4 meses e um reforço com 12 meses.	0,5 ml	IM VLD Ou deltóide D	<u>A idade máxima para receber a vacina contra Pneumo 10 alterou para 4 anos 11 meses e 29 dias, ou seja < 5 anos.</u>	GSK - unidose.
Rota	Gastroenterites(náusea,vômito, diarreia, desidrata-ção...)	2 e 4 meses	1 dose = 1,5ml	Oral	1ª dose até 3m e 15d; 2ª dose até 7m e 29d. Em caso de regurgitar, não readministrar.	Bio-manguinhos - unidose.
Menigo C	Meningite C	3 e 5 meses. O reforço é feito com 1 ano.	0,5ml	IM Vasto anterior da coxa E Ou deltóide E	Quando está não vier diluída, aspira-se 0,6ml de diluente e após a diluição, administra-se 0,5ml da vacina. A idade máxima para receber está alterou para 4a 11m e 29d, ou <5a	FUNED - unidose



VACINA	DOENÇAS QUE IMUNIZAM	ESQUEMA	DOSAGEM	VIA/ LOCAL	OBSERVAÇÃO	LABORATÓRIO/ VALIDADE
Febre Amarela	Febre Amarela	9 meses e 4 anos. Com duas doses o esquema fica completo.	0,5ml	SC Região Deltóide anterior ou posterior à D	30 dias de intervalo com a vacina Tríplice Viral. Não recomendada vacinação para gestantes e mulheres amamentando crianças < 6 meses.	Bio-manguinhos - 6 horas após diluição.
Tríplice Viral	Sarampo, Rubéola e Caxumba	12 meses	0,5 ml	SC Região Deltóide anterior ou posterior à E	Intervalo mínimo de 30 dias entre a 1ª dose de TV e DU de tetraviral e também da vacina Febre Amarela. Gestantes não recebem. A gravidez deve ser evitada nos 30 dias após a vacinação. Adultos < 20 anos devem ter 2 doses e >20 à 49 anos 1 dose conforme esquema vacinal encontrado	Bio-manguinhos - 8 horas após diluição. Contraindicada para quem tem alergia ao ovo. Sanofi- monodose Serum/Índia - 5 doses - 6 horas após diluição Contraindicada para crianças com alergia à proteína do leite.
VOP	Poliomielite	15 meses , 4 anos e Campanhas.	2 gotas	VO Oral	Imunodeprimidos não recebem esta vacina. Quando a criança cuspir e o vacinador presenciar, pode repetí-la uma vez.	Bio-manguinhos - 5 dias Biofarma - 30 dias
Hepatie A	Contra Hepatie A	15 meses	0,5ml	IM VLD	Aletrou para os 15 meses de idade até no máximo 23 meses, ou seja < 2 anos.	MSD - Unidose
Tetraviral	Sarampo, Rubéola, Caxumba e Varicela	15 meses	0,5	SC	Receberão esta dose somente crianças menores de 2 anos, acima devemos fazer 2ª dose de TV.	GSK - unidose
DTP	Difteria, Tétano e Coqueluche.	15 meses e 4 anos.	0,5 ml	IM VLE da coxa ou Deltoide E	Mínimo de intervalo entre doses é de 6 meses, porém normalmente utilizamos 1 ano. Idade máxima para receber é 6 anos 11 meses e 29 dias.	Butantan - 15 dias. Índia - 30 dias





VACINA	DOENÇAS QUE IMUNIZAM	ESQUEMA	DOSAGEM	VIA/ LOCAL	OBSERVAÇÃO	LABORATÓRIO/ VALIDADE
HPV	Ca de colo de útero e verrugas genitais	A partir dos 9 anos. Uma dose 0 e outra 6 meses após.	0,5ml	Deltóide	Idade máxima para receber é 13 anos 11 meses e 29 dias, ou seja, menores que 14 anos. Mulheres com HIV podem receber até os 26 anos e com esquema 0,2 e 6 meses.	MSD - monodose.
dT	Difteria e Tétano.	Acima de 7 anos, completar ou iniciar esquema pendente Após, reforço a cada 10 anos	0,5 ml	IM Deltóide E	Não administrar em menores de 7 anos. Após 5 anos da aplicação, qualquer ferimento, acidente, parto, cirurgia, realizar reforço.	Butantan - 15 dias. Índia - 30 dias
dTP acelular	Difteria, tétano e coqueluche.	1 dose a cada gestação, preferencialmente entre o 27° e 36° mês ou 20 dias antes do parto.	0,5ml	IM Deltóide E	Gestantes com dificuldade de acesso à sala de vacina pode receber está à partir da 20ª semana.	GSK - unidose.

